

MANUAL DE SACRIFICIO PARA CERDAS


En una granja a veces es necesario sacrificar algún cerdo dentro de la propia explotación por razones de bienestar animal, para aliviar o evitar su sufrimiento.

Lo más importante es realizar la eutanasia de un modo humano y seguro.

Para ello el primero paso es el aturdimiento del animal, en nuestro caso con una pistola de bala cautiva, y posterior sacrificio de éste.

Instrucciones de uso del equipo de aturdimiento:

Situar la boca del cañón firmemente sobre la cabeza del animal en la posición que se recomienda en la imagen. El cañón ha de colocarse en la parte frontal de la cabeza, perpendicularmente a la superficie ósea, a unos 20mm por encima de los ojos, hacia la mitad de la frente apuntando hacia la cola.



El operario ha de colocarse siempre en **POSICIÓN SEGURA**, donde el animal NO pueda hacerle daño, prestar especial atención a las extremidades, ya que tras el aturdimiento se puede producir pedaleo.

Apretar el gatillo para disparar. La acción de posicionar la pistola deberá realizarse de forma suave, fluida y exacta disparando inmediatamente en el mínimo tiempo posible. No intentar disparar mientras el animal está moviendo la cabeza.

Comprobar la insensibilidad del animal. La presencia de uno o más de los siguientes signos indicará que el aturdimiento ha sido ineficaz:

- respiración rítmica
- intentos de levantar la cabeza (reflejos)
- vocalizaciones
- reflejo palpebral
- respuesta a un estímulo doloroso

Si el cerdo muestra cierto grado de sensibilidad, la técnica se debe repetir de inmediato. En la ejecución de este nuevo aturdimiento se deberá variar ligeramente la posición del disparo.

La pistola de bala cautiva no causa la muerte en cerdos grandes o en cerdos adultos; sólo los llevan a la inconsciencia, por lo que se necesita una acción posterior para asegurar la muerte del cerdo.

Los cerdos sufren convulsiones tras el disparo, pese a que estén inconscientes; hay que esperar hasta 60 segundos para que se calmen hasta que podamos lacerar el tejido nervioso ("pithing"). Esto implica insertar una varilla en el agujero del cráneo para destruir la base del cerebro – puede utilizarse una varilla específica, pero también sirve un catéter de IA. Es importante no tener los pies entre las patas del cerdo ya que es posible que se produzcan más convulsiones, es mejor estar en el otro lado para insertar la varilla.

Una alternativa es el desangrado mediante la sección de las carótidas con un cuchillo afilado. En ambos casos debe verificarse la muerte mediante el reflejo palpebral.

Confirmación de la muerte - Todos los siguientes signos vitales se debe comprobar 3 minutos después de la aplicación de la eutanasia:

- ausencia de respiración
- ausencia de pulso
- ausencia de movimiento o tono muscular
- ausencia de respuesta a estímulos dolorosos
- ausencia de vocalizaciones
- ausencia de reflejo corneal